Lista de Questões - Neoplasias

GABARITO

1. A ocorrência de pelo menos uma das características a seguir num mesmo grupamento familiar sugere a existência de um componente genético/hereditário que predispõe ao câncer de mama, EXCETO:
 - a. Casos de câncer de mama bilateral.
 - b. Casos de câncer de mama em homens.
 - c. Parentes afetados em três gerações sucessivas.
 - d. Um parente de primeiro grau com diagnóstico da doença no período da pós-menopausa.**
 - e. Negatividade para os receptores hormonais estrogênio ER, progesterona PR e HER2.
2. Sobre o efeito Warburg, marque verdadeiro ou falso:
 - a. (**F**) “O efeito Warburg provoca baixos níveis de absorção de glicose e diminuição da conversão de glicose para lactose através da via glicolítica”.
 - b. (**V**) “A glicólise aeróbica proporciona intermediários metabólicos que são necessários para a síntese de componentes celulares no contexto do efeito Warburg”.
3. Quanto ao processo de metastização, marque verdadeiro ou falso:
 - a. (**V**) “São implantes tumorais descontínuos com o tumor principal”.
 - b. (**V**) “Todos os tumores podem gerar metástases, com exceção dos gliomas e dos carcinomas basocelulares da pele.”
4. Explique as 3 vias das quais podem ocorrer metástases:
 - a. Via linfática:
 - i. A via linfática é via mais comum de disseminação de carcinomas.**
 - ii. Os tumores não possuem vasos linfáticos em seu interior, mas apenas ao seu redor. Células metastáticas que por ventura tomem essa via podem chegar ao linfonodo denominada “linfonodo sentinela”. Esse linfonodo é definido como “o primeiro linfonodo em uma bacia linfática que recebe o fluxo da linfa que vem do tumor primário”. Daí por diante, podem seguir a rota natural de drenagem da cadeia linfática acometida ou podem saltar linfonodos, ou seja, podem fazer um contorno devido à anastomoses venolinfáticas, inflamação ou radiação.**
 - b. Via hematogênica:
 - i. É via a mais comum de disseminação de sarcomas.**
 - ii. Na via hematogênica, devido à espessura da parede das artérias elas são comumente menos penetradas que as veias. Portanto, a via de disseminação venosa é mais comum e ocorre com o desprendimento de células metastáticas que alcançam o primeiro leito capilar que**

Lista de Questões - Neoplasias

- encontram. Os dois leitos capilares mais acometidos são o fígado (toda drenagem portal flui para o fígado) e o pulmão (toda drenagem da veia cava flui para o pulmão).
- iii. A via de disseminação arterial pode ocorrer nos seguintes contextos:
1. Passagem através dos leitos capilares pulmonares (em pequenas artérias do leito?);
 2. Através de shunts arteriovenos pulmonares;
 3. Formação de êmbolo tumoral originadas por metástases pulmonares.
- c. Via implantação:
- i. Pode ocorrer em processos cirúrgicos e o local mais atingido é a cavidade peritoneal. As células metastáticas que aderem à superfície ou cavidade acometida podem permanecer aderidas sem penetrar ou podem penetrar e gerar um novo tumor. Outros locais que podem ser acometidos dessa forma são as cavidades pleural, pericárdica, subaracnóidea e o espaço articular.
5. Explique as 4 classes de reguladores gênicos:
- a. Proto-oncogenes:
 - i. São genes potencialmente oncogênicos, ou seja, não se tornaram ainda oncogenes. Porém, em caso de mutações podem torna-se oncogenes e estimularem o crescimento de células tumorais assim como sua proliferação. Além disso são considerados dominantes – um alelo é suficientemente transformador mesmo na presença de outro alelo normal.
 - b. Genes supressores tumorais:
 - i. São genes que inibem o crescimento e a proliferação celular. Além disso, são considerados recessivos – Ambos os alelos devem estar lesionados para que ocorra transformação – Entretanto, há uma exceção: a perda de um alelo as vezes torna a proteína supressora menos ativa e incapaz de frear a proliferação celular (haploinsuficiência).
 - c. Genes reguladores da apoptose:
 - i. São genes que impedem a apoptose e que podem atuar como proto-oncogenes ou como genes supressores tumorais;
 - d. Genes envolvidos no reparo do DNA:
 - i. Esses genes controlam o processo de reparo do DNA que é essencial para correção de processos danosos como mutações, inserções, deleções e etc. Mutações nesses genes podem aumentar a susceptibilidade a esses processos danosos ao DNA.
6. Qual o papel da p53 na angiogênese?

Lista de Questões - Neoplasias

A p53 estimula a expressão de moléculas antiangiogênicas como trombospondina-1 e atua na repressão da expressão de moléculas pró-angiogênicas como a VEGF.

7. Explique como as células abaixo reconhecem as células tumorais e as combatem:
 - a. Linfócitos T citotóxicos:
 - i. **Essas células ao serem apresentadas a antígenos de células tumorais atuam produzindo citotoxinas (granzimas e perforinas) que provocam a apoptose da célula alvo. Além disso, possuem em especial um papel protetor contra neoplasias causadas por vírus.**
 - b. Células natural killer:
 - i. **Essas células são estimuladas pelas IL-2 e IL-15 e provocam a lise de células cancerígenas sem necessidade de sensibilização.**
 - c. Macrófagos:
 - i. **Após serem estimulados por interferon gama e por interleucinas (IL-1, IL-2, IL-10) atuam fagocitando e destruindo células tumorais através da produção de EROS.**
8. Fale acerca dos efeitos de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2.
 - a. São genes supressores de tumor.
 - b. As células das quais esses genes encontram-se inativados desenvolvem quebras cromossômicas e intensa aneuploidia. Tais processos predisõem a transformação maligna dessas células.
 - c. Estão envolvidos em 25% dos casos de câncer de mama familiar – Raramente esses genes são inativados nos casos de câncer de mama esporádico.
 - d. As mutações no gene BRCA1 estão envolvidas em um maior risco de câncer epitelial de ovário e câncer de próstata em homens.
 - e. **As mutações no gene BRCA2 estão envolvidas em um maior risco para câncer de mama, de ovário, de próstata, de pâncreas, das vias biliares e etc.**
9. De que forma os rearranjos cromossômicos abaixo podem gerar desregulações gênicas e levar ao câncer:
 - a. Translocação cromossômica:
 - i. **A translocação pode ativar proto-oncogenes e isso pode ocorrer de duas formas:**
 1. **Troca dos elementos reguladores de um proto-oncogene por elementos reguladores de outro gene com alta expressão gerando, portanto, superexpressão. Exemplo: No linfoma de Burkitt ocorre uma translocação (8:14)(q24;q32) envolvendo um oncogene (MYC) e o gene que codifica o receptor de antígeno (IGH). A translocação remove as sequências reguladoras do gene MYC e as substitui pelas sequências reguladoras do gene da cadeia pesada da imunoglobulina**

Lista de Questões - Neoplasias

(IGH) – O IGH é altamente expresso nos precursores das células B.

2. Formação de um gene de fusão – Codificação de proteína quimérica com novas propriedades. Exemplo: Leucemia mielóide crônica, com a formação da proteína de fusão BCR-ABL.

b. Deleção:

i. Essas deleções podem resultar em inativação de genes supressores de tumor – Exemplos: genes RB e VHL – ou na ativação de oncogenes por meio da justaposição dos proto-oncogenes com um promotor ativo assim como ocorre na translocação – EX: TAL1 e a EML4-ALK.

c. Amplificação gênica:

i. Essa amplificação gera uma superexpressão de uma sequência em específico de um gene alterado. Isso ocorre em especial com os genes NMYC no neuroblastoma e ERBB2 em cânceres de mama.

10. Explique de que forma os vírus abaixo podem ser oncogênicos:

a. HPV:

i. É o causador de uma DST etiológica para o câncer de colo de útero e sua ação oncogênica se dá basicamente pela integração do genoma viral com o genoma do hospedeiro. Essa integração leva a perda do repressor viral E2 e a superexpressão das oncoproteínas E6 e E7 que possuem como ação:

1. Ação de E6 – Liga-se ao p53 e promove a sua degradação, e estimula a expressão da subunidade catalítica da telomerase (TERT).

2. Ação de E7 – Ligação à proteína RB deslocando E2F e inativação dos inibidores de CDK p21 e p27

b. EBV:

i. É o causador da mononucleose infecciosa. Esse vírus infecta células B e promove uma infecção latente, porém com a expressão de proteínas virais. Uma dessas proteínas é a Proteína de Membrana Latente 1 (LMP1) que comporta-se como um receptor CD40 constitutivamente ativo. Esse receptor é usado pelas células T auxiliares para estimular a proliferação de células B.

c. HBV e HCV:

i. Segundo o Robbins: “Estima-se que 70% a 85% dos carcinomas hepatocelulares em todo o mundo são causados por infecção com vírus da hepatite B (HBV) ou C (HCV)”.

ii. O efeito oncogênico do HBV e do HCV se processa, assim como na HBV, por meio da interação entre os genomas viral e do hospedeiro.

Lista de Questões - Neoplasias

Os genomas do HBV e do HCV, entretanto, não codificam nenhuma oncoproteína viral. Portanto, o efeito oncogênico desses vírus se processa por meio da instalação de uma infecção viral crônica (ambiente inflamatório com agentes genotóxicos) que possui maiores repercussões sobre o fígado e que leva a proliferação compensatória dos hepatócitos. A inflamação crônica não resolvida com resposta imune inadequada agrava ainda mais a situação.